

检出这些妇科疾病时，性伴侣也要查！

——欧燕兰 副主任医师

很多女性朋友患了妇科疾病羞于就医，也不告诉自己的性伴侣，导致病情加重或反复发作。

告诉你一个秘密




特别提醒：当被检出以下几种妇科疾病，请告诉自己性伴侣也要检查，必要时一起治疗哦！



一 滴虫性阴道炎


滴虫性阴道炎阴道毛滴虫引起的炎症。**经性交直接传播是为主要传播方式，也可间接传播。主要症状如下：**白带异常及外阴瘙痒，白带典型特点为稀薄脓性、泡沫状、有异味。患滴虫阴道炎患者可同时存在尿道、尿道旁腺、前庭大腺多部位滴虫感染引发多种症状。阴道毛滴虫还能吞噬精子，影响精子在阴道内存活影响受孕。

滴虫可寄生于男性的包皮皱褶、尿道或前列腺中，男性由于感染滴虫后常无症状，易成为感染源。也可经公共浴池、浴盆、浴巾、游泳池、坐式便器、衣物、污染的器械及敷料等间接传播。



二 衣原体感染

衣原体感染由沙眼衣原体引起。主要见于性传播疾病。大部分患者无症状，有症状者主要表现为白带增多，呈黏液脓性。此外，可出现经间期出血、性交后出血等症状。妇科检查见子宫颈充血、有黏液脓性分泌物附着甚至从子宫颈管流出，出血等。若合并尿路感染，可出现尿急、尿频、尿痛。衣原体感染子宫颈管柱状上皮，沿黏膜面扩散引起子宫颈管炎症、宫内膜炎、输卵管炎、盆腔炎等，可出现腹痛、腹胀、发热等。



三 淋病

淋病的病原体是淋病奈瑟菌。主要为性传播疾病。主要症状如下：主要表现为白带增多，呈黏液脓性，阴道分泌物刺激可引起外阴瘙痒及灼热感、尿道口、阴道口黏膜充血、水肿以及多量脓性分泌物。病情蔓延可引起子宫内膜炎、盆腔炎、输卵管堵塞、不孕等。

此外，感染苍白密螺旋体导致的梅毒、人乳头瘤病毒导致的尖锐湿疣、感染单纯疱疹病毒导致的生殖器疱疹等均为经性生活传播的常见疾病，若性伴侣其中一方有确诊感染，建议另一方同时检查。



以上疾病经检查确诊后切勿自行随意用药。建议双方在专科医生评估、指导下同时治疗，治愈前应避免无保护性行为。

